


MR CLEAN MED

Patiënten komen in aanmerking voor MR CLEAN-MED indien zij:

Binnen 0 - 6 uur in het interventiecentrum aankomen ongeacht of ze intraveneuze behandeling met alteplase hebben ondergaan voor aanvang van de endovasculaire trombectomie.



MR CLEAN MED

MR CLEAN-MED: Een multicentrum gerandomiseerde klinische studie naar de endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct in Nederland.
Het effect van periprocedurele medicatie: lage dosis (LD) en intermediaire dosis (MD) heparine (HEP), acetylsalicylzuur (ASA), beide of geen van beide.

3 EXCLUSIE CRITERIA

- Pre-stroke mRS > 2
- Behandeling met IV alteplase ondanks contra-indicaties (volgens landelijk protocol)
- Contra-indicaties voor acetylsalicylzuur en/of heparine
- INR > 3.0
- Bekende hemorrhagische diathese of bekende trombocytopenie < 90⁹/L
- Therapeutisch LMWH of ongefractioneerd heparine gebruik
- Deelname aan een andere trial dan MR ASAP

BLOEDAFNAMEMOMENTEN

(per keer: 1x serumbuis, 2x stollingsbuis, 1x EDTA-buis)

- < 1 uur voor EVT (na randomisatie op de SEH of op de interventiekamer)
- < 1 uur na EVT (direct bij aankomst op de klinische afdeling)
- 24 uur na EVT (bij voorkeur niet eerder dan 24 uur na EVT, vóór ontslag)
- 2-6 maanden na interventie (alleen bij reguliere afspraak)

TEAM ERASMUS MC

Prof. Dr. Diederik W.J. Dippel, Neuroloog | Prof. Dr. Aad van der Lugt, Radioloog
Dr. Adriaan C.G.M. van Es, Interventie Neuroradioloog | Dr. Bob Roozenbeek, Neuroloog
Wouter van der Steen, Arts-onderzoeker | Rob A. van de Graaf, Arts-onderzoeker

CONTACT

E-mail: mrclean.med@erasmusmc.nl
Website: www.mrclean-med.nl
Telefoon: 06 (lokaal MRCLEAN-MED team trial telefoon)

CONTRAST

Collaboration for New Treatments of Acute Stroke

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

